

LIPID-PRÄPARATE	KONSERVIERT	Anwendungsbereich	Funktion	Inhaltsstoffe	Viskosität	Hinweis für Kontaktlinsenträger	Konservierungsmittel
	Liposic® Fluid Augengel-Tropfen	mäßige bis schwere Formen des Trockenen Auges	Schutz vor Verdunstung, lang anhaltende Benetzung	Triglyceride, Carbomer	mittel	alle KL vor Anwendung herausnehmen, nach 15 min. wieder einsetzen	0,01 % Cetrimid
	Liposic® Augengel	mäßige bis schwere Formen des Trockenen Auges	Schutz vor Verdunstung, lang anhaltende Benetzung	Triglyceride, Carbomer	hoch	alle KL vor Anwendung herausnehmen, nach 15 min. wieder einsetzen	0,01 % Cetrimid
	UNKONSERVIERT						
	Liposic® EDO® Augengel-Tropfen	mäßige bis schwere Formen des Trockenen Auges	Schutz vor Verdunstung, lang anhaltende Benetzung	Triglyceride, Carbomer	mittel	alle KL vor Anwendung herausnehmen, nach 15 min. wieder einsetzen	keine

DEXPANTHENOL-PRÄPARATE	KONSERVIERT	Anwendungsbereich	Funktion	Inhaltsstoffe	Viskosität	Hinweis für Kontaktlinsenträger	Konservierungsmittel
	Corneregel® Fluid Augentropfen	mäßige Formen des Trockenen Auges mit Hornhauterosion	Epithelisierung, Wundheilung, Benetzung	Panthenol, Hypromellose	niedrig	alle KL vor Anwendung herausnehmen, nach 15 min. wieder einsetzen	0,01 % Cetrimid
	Corneregel® Augengel	mäßige bis schwere Formen des Trockenen Auges mit Hornhauterosion	Epithelisierung, Wundheilung, Benetzung	Panthenol, Carbomer	hoch	alle KL vor Anwendung herausnehmen, nach 15 min. wieder einsetzen	0,01 % Cetrimid
	UNKONSERVIERT						
	Corneregel® Fluid EDO® Augentropfen	mäßige Formen des Trockenen Auges mit Hornhauterosion	Epithelisierung, Wundheilung, Benetzung	Panthenol, Hypromellose	niedrig	alle KL vor Anwendung herausnehmen, nach 15 min. wieder einsetzen	keine
	Corneregel® EDO® Augengel-Tropfen	mäßige bis schwere Formen des Trockenen Auges mit Hornhauterosion	Epithelisierung, Wundheilung, Benetzung	Panthenol, Carbomer	hoch	alle KL vor Anwendung herausnehmen, nach 15 min. wieder einsetzen	keine

VITAMIN-A-PRÄP.	KONSERVIERT	Anwendungsbereich	Funktion	Inhaltsstoffe	Viskosität	Hinweis für Kontaktlinsenträger	Konservierungsmittel
	Vitafluid® Augentropfen	leichte bis mäßige Formen des Trockenen Auges (durch Vitamin-A-Mangel)	Regeneration, Unterstützung, Benetzung	Retinolpalmitat, Hypromellose	niedrig	alle KL vor Anwendung herausnehmen, nach 15 min. wieder einsetzen	0,3 % Chlorbutanol
	Vitagel® Augengel	mäßige bis schwere Formen des Trockenen Auges (durch Vitamin-A-Mangel)	Regeneration, Unterstützung, Benetzung	Retinolpalmitat, Carbomer	hoch	alle KL vor Anwendung herausnehmen, nach 15 min. wieder einsetzen	0,01 % Cetrimid