

Impfkalender

Von der STIKO (Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts) empfohlene Impfungen nach Altersklassen

empfohlenes Impfalter	Diphtherie	Wundstarrkrampf (Tetanus)	Keuchhusten (Pertussis)	Haemophilus influenzae Typ b	Kinderlähmung (Poliomyelitis)	Hepatitis B	Masern, Mumps, Röteln	Windpocken	Influenza	Pneumokokken +	Meningokokken	Humane Papillomaviren (HPV)	Rotaviren
6 Wochen													1.
2 Monate	1.	1.	1.	1.	1.	1.				1.			2.
3 Monate	2.	2.	2.	2.+	2.+	2.+							3.*
4 Monate	3.	3.	3.	3.	3.	3.				2.			
11–14 Monate	4.	4.	4.	4.	4.	4.	1.	1.		3.			
15–23 Monate							2.	2.			1.		
5–6 Jahre	A	A	A										
9–14 Jahre	A	A	A		A							SM	
15–17 Jahre													
ab 18 Jahre	** ** A	** ** A	*** *** A				S#						
ab 60 Jahre									** S	*** S			

Quelle: rki.de

A: Auffrischung

S: Standardimpfung

SM: Standardimpfung für Mädchen und seit Juni 2018 auch Empfehlung für Jungen

Masernimpfung für alle nach 1970 geborenen Erwachsenen, die noch gar nicht oder nur einmal in der Kindheit geimpft wurden oder deren Impfstatus unklar ist.

+ Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten

***** bei bestimmten Stoffen kann dieser Termin entfallen

****** jährlich mit aktuellem Impfstoff

******* Wiederimpfung alle 5 Jahre (nur bei bestimmten Indikationen)

****** Wiederimpfung alle 10 Jahre

******* Grundimmunisierung mit 2 bzw. 3 Dosen je nach Alter und Impfstoff

******* einmalig im Erwachsenenalter