Sanum

Sanuvis® Flüssige Verdünnung

Darreichungsform:	Tropfen zum Einnehmen
Präparatgruppe:	Präparate aus physiologischen Carbonsäuren
Wirkstoff:	Acidum L(+)-lacticum D4/D6/D12/D30/D200 Potenzakkord
Zusammensetzung:	100 ml flüssige Verdünnung enthalten: 20 ml Acidum L(+)-lacticum D4 dil. 20 ml Acidum L(+)-lacticum D6 dil. 20 ml Acidum L(+)-lacticum D12 dil. 20 ml Acidum L(+)-lacticum D30 dil. 20 ml Acidum L(+)-lacticum D200 dil. (HAB, Vorschrift 5a mit gereinigtem Wasser, ab D2 mit Ethanol 15% (m/m), ab D3 mit Ethanol 30% (m/m)).
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	3x täglich 60 Tropfen (= ca. 1 Teelöffel bzw. 1/2 Eßlöffel) vor den Mahlzeiten einnehmen.
Nebenwirkungen:	Keine bekannt.
Gegenanzeigen:	Bei Alkohol- oder Leberkranken sollte aufgrund des Alkoholgehaltes das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Unerwünschte Reaktionen:	
Wechselwirkungen:	Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen:	Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur

	Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Hinweis:	
Warnhinweis:	Enthält 36,2 Vol.% Alkohol (Ethanol).
Dauer der Behandlung:	
Handelsform:	100 ml Tropfflasche PZN 02360292; 10x 100 ml Bündelpackung PZN 02360300.
Stand vom:	12/2004