

Sanum

Nigersan® D5 Tabletten



Darreichungsform:	Tabletten zum Einnehmen
Präparatgruppe:	Pilzpräparat
Wirkstoff:	Aspergillus niger D5
Zusammensetzung:	1 Tablette enthält: 250 mg Aspergillus niger D5 trit. (HAB, Vorschrift 6). Hilfsstoffe: Kartoffelstärke, Magnesiumstearat.
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	1–3 mal täglich 1 Tablette mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen. Nach längstens 4 Wochen Therapiedauer sollte Nigersan® D5 abgesetzt werden.
Nebenwirkungen:	Aufgrund des Gehaltes von Nigersan® D5 an spezifischen organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen, hauptsächlich in Form von Hautreaktionen, auftreten und eine Allergie gegen den Bestandteil Aspergillus niger ausgelöst werden. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.
Gegenanzeigen:	Nicht anwenden bei: <ul style="list-style-type: none">• bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Schimmelpilzen (Aspergillus niger)• Autoimmunerkrankungen• Kindern unter 12 Jahren• Schwangeren und Stillenden

Unerwünschte Reaktionen:

Wechselwirkungen: Immunsuppressiv wirkende Arzneimittel können die Wirksamkeit von Nigersan® D5 beeinträchtigen.
Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.

Vorsichtsmaßnahmen: Keine bekannt.

Hinweis: Enthält Lactose. Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehaltes an Lactose ungeeignet für Patienten mit der selten vorkommenden Galactose-Unverträglichkeit (Galactose-Intoleranz), einem genetischen Lactasemangel oder einer Glucose-Galactose-Malabsorption.

Zusatzhinweis: Aspergillus niger ist als Wirkstoff auch im Kombinationspräparat Sankombi® enthalten.

Dauer der Behandlung:

Handelsform: Packung mit 20 Tabletten PZN 04603907;
Bündelpackung mit 10x 20 Tabletten PZN 04603913.

Stand vom: 03/2013